

MEMORIA GENERAL DE RESULTADOS

**Registro Español del Grupo Español de Cirugía
Oncológica Peritoneal
REGE COP**

2025

RESPONSABLES POR CENTRO DEL REGISTRO ESPAÑOL DE CIRUGÍA ONCOLÓGICA PERITONEAL

Dr. Pere Bretcha	H. Quirónsalud Torrejvieja	Alicante
Dr. Juan Torres Melero	H. Torrecárdenas	Almería
Dr. Domenico Sabia	H. Sant Joan Despi Moises Broggi	Barcelona
Dr. Álvaro Arjona	HU. Reina Sofía	Córdoba
Dra. Natividad Palencia	HGU. Gregorio Marañón	Madrid
Dra. Gloria Ortega	MD Anderson Cancer Center	Madrid
Dr. Israel Manzanedo	HU. Fuenlabrada	Madrid
Dr. Fernando López Mozos	H. Clínico U de Valencia	Valencia
Dra. Alida González Gil.	HU. Virgen de la Arrixaca	Murcia
Dra. Cristina Pineño	HU. Son Espases	Palma de Mallorca
Dra. Vanessa Concepción	HU. Ntra Sra de la Candelaria	Sta. Cruz de Tenerife
Dra. Araceli Mayol Oltra	Consorcio Hospitalario Provincial	Castellón
Dra. María Caballero Soto.	Instituto Valenciano de Oncología	Valencia
Dr. Fernando Martínez Regueira	Clínica Universidad de Navarra	Pamplona
Dr. Xabier Arteaga	HU. Donostia	Gipuzkoa
Dra. Remedios Gómez Sanz	HU. Príncipe de Asturias, Alcalá	Madrid
Dra. Susana Sánchez García	HU. Ciudad Real	Ciudad Real
Dr. Enrique Asensio	HU. Río Hortega	Valladolid
Dra. Marta Roldón Golet	H. Quirón Málaga	Málaga
Dr. Manuel Artiles Armas	HU. Dr. Negrín	Las Palmas de GC
Dr. Javier Vaqué Urbaneja	H. La Fe	Valencia
Dra. Ainhoa Sánchez Pérez.	HGU. Reina Sofía	Murcia
Dr. Pedro Villarejo Campos	Fundación Jiménez Díaz	Madrid
Dr. Daniel Díaz Gómez	H. Virgen del Rocío	Sevilla
Dra. Laura González Sánchez	Complejo H Insular	Las Palmas de GC
Dra. Rosa María Álvarez Seoane	Complejo HU. A Coruña	A Coruña
Dra. Estrella Turienzo	HU. Central	Asturias
Dr. Ibán Caravaca García	H. General U. de Elche	Alicante
Dra. Isabel Jaen.	HU. Infanta Cristina	Badajoz
Dr. Juan José Segura.	HU. La Paz	Madrid
Dr. Julio Galindo Álvarez	HU. Ramón y Cajal	Madrid
Dr. Vicente Borrego Estella	H. Clínico U. "Lozano Blesa"	Zaragoza
Dr. Alberto Titos García	H. Regional Universitario	Málaga
Dr. Eduardo Díaz Reques	HM. U. Sanchinarro	Madrid
Dr. Manuel E. Marcello	HU. Fundación Alcorcón	Madrid
Dr. Pablo Haro	HU. Infanta Elena, Valdemoro	Madrid
Dr. Raquel Conde	HU. Virgen de las Nieves	Granada
Dra. Silvia Marsans	H. del Mar	Barcelona
Dr. José López	HU. Virgen de la Macarena	Sevilla
Dra. Silvia Carbonell	HGU. Dr. Balmis	Alicante
Dr. Virgilio Ruiz	H.U. Ntra. Sra. de Valme	Sevilla
Dra. Irene Arjona Medina	H.U. Clínico San Cecilio	Granada

RESPONSABLE DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS DEL REGECOP

Dr. Israel Manzanedo Romero

Cirujano Adjunto del H. Universitario de Fuenlabrada, Madrid.

COORDINADOR DEL REGECOP

Dr. Fernando Pereira

Jefe de Servicio de Cirugía General y AD del H. Universitario de Fuenlabrada, Madrid


Presidente SEOQ 2023-2026

ÍNDICE


ACTIVIDAD DE CIRUGÍA ONCOLÓGICA PERITONEAL.....	4
CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES.....	8
RESULTADOS GLOBALES.....	9
PROBABILIDAD RECIDIVA.....	15
SUPERVIVENCIA GLOBAL.....	16
RESULTADOS EN METÁSTASIS PERITONEALES DE CÁNCER DE COLON.....	17
RESULTADOS EN METÁSTASIS PERITONEALES DE CÁNCER DE OVARIO.....	31
RESULTADOS EN PSEUDOMIXOMA PERITONEAL.....	45
RESULTADOS EN METÁSTASIS PERITONEALES DE CÁNCER GÁSTRICO.....	59
RESULTADOS EN MESOTELIOMA PERITONEAL.....	73
RESULTADOS EN INDICACIONES NO CONVENCIONALES.....	87

ACTIVIDAD DE CIRUGÍA ONCOLÓGICA PERITONEAL


Número de procedimientos por centro




Número de procedimientos por año




Procedimientos




Origen tumoral




Escenario




NEOADYUVANCIA




SEXO




EDAD




VÍA DEL PROCEDIMIENTO - CIRUGÍA




INTENCIÓN - CIRUGÍA




MÁS DE 4 PROCEDIMIENTOS




PCI




CITORREDUCCIÓN




HIPEC - TÉCNICA




HIPEC - TIEMPO




HIPEC - FÁRMACO




COMPLICACIONES



REINTERVENCIONES




TRATAMIENTO RECIDIVA




Probabilidad acumulada de Recidiva Global
CCS 0-1 y SG > 3 meses

- Tumor=1- PMP
- Tumor=2- Mesotelioma
- Tumor=3- Colo-Rectal
- Tumor=4- Ovario/PP
- Tumor=5- Gástrico
- Tumor=6- Indicaciones No Conv.




Curvas de Supervivencia Global
Operados con intención inicial curativa




CÁNCER COLO-RECTAL


Número de procedimientos por año




Procedimientos




Escenario




NEOADYUVANCIA




SEXO




EDAD




VÍA DEL PROCEDIMIENTO - CIRUGÍA




INTENCIÓN - CIRUGÍA




MÁS DE 4 PROCEDIMIENTOS




PCI




CITORREDUCCIÓN




HIPEC - TÉCNICA




HIPEC - TIEMPO




HIPEC - FÁRMACO




COMPLICACIONES



REINTERVENCIONES




TRATAMIENTO RECIDIVA




**Probabilidad de Recidiva Global
CCS 0-1 y SG > 3 meses**

Tumor: 3- Colo-Rectal
Mediana: 1.58 años | Recidiva 3 años: 65.3% | Recidiva 5 años: 70.1%




Curva de Supervivencia Global
Operados con intención inicial curativa

Tumor: 3- Colo-Rectal




Curva de Supervivencia Libre de Enfermedad
Operados con intención inicial curativa

Tumor : 3- Colo-Rectal




Curva de Supervivencia Global según CCS
Operados con intención inicial curativa

CCS=CCS 0 - CCS 1 | Mediana 3.67 a | S3a: 58.9% | S5a: 38.5%
CCS=CCS 2 - CCS 3 | Mediana 1 a | S3a: 11.7% | S5a: NA




Curva de Supervivencia Global según PCI
Operados con intención inicial curativa

PCI 0 | Mediana: 10.58 a | S3a: 78.4% | S5a: 70.1%
PCI 1-10 | Mediana: 4 a | S3a: 64.4% | S5a: 42.3%
PCI 11-15 | Mediana: 2.75 a | S3a: 41.2% | S5a: 18.1%
PCI 16-20 | Mediana: 1.83 a | S3a: 24.9% | S5a: 7.8%
PCI 21-39 | Mediana: 1 a | S3a: 19.9% | S5a: 8.9%




CÁNCER DE OVARIO/PERITONEAL PRIMARIO


Número de procedimientos por año




Procedimientos




Escenario



NEOADYUVANCIA



SEXO



● 2 - Mujer

EDAD

59,00


Mediana

51,00


Cuartil 1

67,00


Cuartil 3




VÍA DEL PROCEDIMIENTO - CIRUGÍA




INTENCIÓN - CIRUGÍA




MÁS DE 4 PROCEDIMIENTOS




PCI




CITORREDUCCIÓN




HIPEC - TÉCNICA




HIPEC - TIEMPO



HIPEC - FÁRMACO



COMPLICACIONES



9

Mediana estancia


7

Cuartil estancia 1


15

Cuartil estancia 3

REINTERVENCIONES




TRATAMIENTO RECIDIVA




Probabilidad de Recidiva Global
CCS 0-1 y SG > 3 meses

Tumor: 4- Ovario/PP
Mediana: 2 años | Recidiva 3 años: 61.1% | Recidiva 5 años: 68.1%




Curva de Supervivencia Global
Operados con intención inicial curativa

Tumor: 4- Ovario/PP




Curva de Supervivencia Libre de Enfermedad
Operados con intención inicial curativa

Tumor : 4- Ovario/PP




Curva de Supervivencia Global según CCS
Operados con intención inicial curativa

CCS=CCS 0 - CCS 1 | Mediana 5.5 a | S3a: 70.5% | S5a: 51.9%
CCS=CCS 2 - CCS 3 | Mediana 1.08 a | S3a: 15.7% | S5a: 12.5%




Curva de Supervivencia Global según PCI
Operados con intención inicial curativa

PCI = 0 | Mediana: No alcanzada | S3a: 64.4% | S5a: 57.6%
PCI 1-9 | Mediana: 7.17 a | S3a: 76.9% | S5a: 59.8%
PCI 10-19 | Mediana: 4.17 a | S3a: 67.5% | S5a: 44%
PCI 20-39 | Mediana: 3.17 a | S3a: 52.2% | S5a: 39.1%




PSEUDOMIXOMA PERITONEAL


Número de procedimientos por año




Procedimientos




Escenario




NEOADYUVANCIA




SEXO




EDAD




VÍA DEL PROCEDIMIENTO - CIRUGÍA




INTENCIÓN - CIRUGÍA




MÁS DE 4 PROCEDIMIENTOS




PCI




CITORREDUCCIÓN




HIPEC - TÉCNICA




HIPEC - TIEMPO




HIPEC - FÁRMACO




COMPLICACIONES



REINTERVENCIONES




TRATAMIENTO RECIDIVA




Probabilidad de Recidiva Global
CCS 0-1 y SG > 3 meses

Tumor: 1- PMP
Mediana: no alcanzada | Recidiva 3 años: 19.2% | Recidiva 5 años: 23%




Curva de Supervivencia Global
Operados con intención inicial curativa

Tumor: 1- PMP




Curva de Supervivencia Libre de Enfermedad
Operados con intención inicial curativa

Tumor : 1- PMP




Curva de Supervivencia Global según CCS Operados con intención inicial curativa

CCS=CCS 0 - CCS 1 | Mediana 10.5 a | S3a: 84.9% | S5a: 79%
CCS=CCS 2 - CCS 3 | Mediana 2.08 a | S3a: 29.3% | S5a: 14.7%




Curva de Supervivencia Global según PCI Operados con intención inicial curativa

PCI = 0 | Mediana: 10.5 a | S3a: 96% | S5a: 96%
PCI 1-9 | Mediana: No alcanzada | S3a: 89.1% | S5a: 81.8%
PCI 10-19 | Mediana: 8 a | S3a: 81.4% | S5a: 73.4%
PCI 20-39 | Mediana: 8 a | S3a: 69.2% | S5a: 60.6%




CÁNCER GÁSTRICO


Número de procedimientos por año




Procedimientos




Escenario




NEOADYUVANCIA




SEXO




EDAD




VÍA DEL PROCEDIMIENTO - CIRUGÍA




INTENCIÓN - CIRUGÍA




MÁS DE 4 PROCEDIMIENTOS




PCI




CITORREDUCCIÓN




HIPEC - TÉCNICA




HIPEC - TIEMPO




HIPEC - FÁRMACO




COMPLICACIONES



REINTERVENCIONES




TRATAMIENTO RECIDIVA




Probabilidad de Recidiva Global
CCS 0-1 y SG > 3 meses


Tumor: 5- Gástrico
Mediana: 0.92 años | Recidiva 3 años: 80% | Recidiva 5 años: 81.7%



Curva de Supervivencia Global
Operados con intención inicial curativa
Tumor: 5- Gástrico




Curva de Supervivencia Libre de Enfermedad
Operados con intención inicial curativa
Tumor : 5- Gástrico




Curva de Supervivencia Global según CCS
Operados con intención inicial curativa

CCS=CCS 0 - CCS 1 | Mediana 1.42 a | S3a: 26.3% | S5a: 19.1%
CCS=CCS 2 - CCS 3 | Mediana 0.42 a | S3a: NA | S5a: NA




Curva de Supervivencia Global según PCI
Operados con intención inicial curativa

PCI 0 | Mediana: 3 a | S3a: 48.6% | S5a: 35.1%
PCI 1-6 | Mediana: 1.33 a | S3a: 22.9% | S5a: 18.9%
PCI 13-20 | Mediana: 0.92 a | S3a: NA | S5a: NA
PCI 20-39 | Mediana: 0.33 a | S3a: NA | S5a: NA
PCI 7-12 | Mediana: 0.67 a | S3a: 10.2% | S5a: 3.8%




MESOTELIOMA PERITONEAL


Número de procedimientos por año




Procedimientos




Escenario




NEOADYUVANCIA




SEXO




EDAD




VÍA DEL PROCEDIMIENTO - CIRUGÍA




INTENCIÓN - CIRUGÍA




MÁS DE 4 PROCEDIMIENTOS




PCI




CITORREDUCCIÓN




HIPEC - TÉCNICA




HIPEC - TIEMPO




HIPEC - FÁRMACO




COMPLICACIONES



REINTERVENCIONES




TRATAMIENTO RECIDIVA




Probabilidad de Recidiva Global
CCS 0-1 y SG > 3 meses

Tumor: 2- Mesotelioma
Mediana: 7.25 años | Recidiva 3 años: 40.4% | Recidiva 5 años: 42.8%




Curva de Supervivencia Global
Operados con intención inicial curativa

Tumor: 2- Mesotelioma




Curva de Supervivencia Libre de Enfermedad
Operados con intención inicial curativa

Tumor : 2- Mesotelioma




Curva de Supervivencia Global según CCS Operados con intención inicial curativa

CCS=CCS 0 - CCS 1 | Mediana 10.33 a | S3a: 68.3% | S5a: 56.9%
CCS=CCS 2 - CCS 3 | Mediana 2.5 a | S3a: 40.7% | S5a: 27.2%




Curva de Supervivencia Global según PCI Operados con intención inicial curativa

PCI = 0 | Mediana: No alcanzada | S3a: 100% | S5a: 100%
PCI 1-9 | Mediana: 10.33 a | S3a: 76% | S5a: 67.6%
PCI 10-19 | Mediana: 4.25 a | S3a: 64.1% | S5a: 42.7%
PCI 20-39 | Mediana: 4.25 a | S3a: 56.3% | S5a: 49.3%




INDICACIONES NO CONVENCIONALES


Número de procedimientos por año




Procedimientos




Escenario




NEOADYUVANCIA




SEXO




EDAD





VÍA DEL PROCEDIMIENTO - CIRUGÍA




INTENCIÓN - CIRUGÍA




MÁS DE 4 PROCEDIMIENTOS




CITORREDUCCIÓN




HIPEC - TÉCNICA




HIPEC - TIEMPO




HIPEC - FÁRMACO




COMPLICACIONES



REINTERVENCIONES




TRATAMIENTO RECIDIVA




Probabilidad de Recidiva Global
CCS 0-1 y SG > 3 meses

Tumor: 6- Indicaciones No Conv.
Mediana: 1.42 años | Recidiva 3 años: 63.4% | Recidiva 5 años: 66.8%




Curva de Supervivencia Global
Operados con intención inicial curativa

Tumor: 6- Indicaciones No Conv.




Curva de Supervivencia Libre de Enfermedad
Operados con intención inicial curativa

Tumor : 6- Indicaciones No Conv.



Curva de Supervivencia Global según CCS Operados con intención inicial curativa

CCS=CCS 0 - CCS 1 | Mediana 6.58 a | S3a: 58.8% | S5a: 50.3%
CCS=CCS 2 - CCS 3 | Mediana 2.25 a | S3a: 34.6% | S5a: 34.6%



Curva de Supervivencia Global según PCI Operados con intención inicial curativa

PCI = 0 | Mediana: 11.17 a | S3a: 93.8% | S5a: 93.8%
PCI 1-9 | Mediana: 4.5 a | S3a: 56.3% | S5a: 49.1%
PCI 10-19 | Mediana: 4.25 a | S3a: 50.6% | S5a: 41.2%
PCI 20-39 | Mediana: 2.25 a | S3a: 34.6% | S5a: 28.3%

